

Derzeitige Behandlungsstudien

Non-Hodgkin-Lymphome:

- OSHO-Studie Nr. #70: Randomisierte Phase III-Studie zur Primärtherapie von fortgeschrittenen follikulären Lymphomen mit Immunochemotherapie +/- Erhaltungstherapie mit Rituximab bei älteren Patienten (> 65 J.) und jüngere Patienten, die nicht für eine Hochdosistherapie mit autologer Blutstammzelltransplantation qualifizieren.
- CLL-2M: Multizentrische Phase II-Studie, Bendamustin plus Rituximab bei Patienten mit Chronisch Lymphatischer Leukämie.

Morbus-Hodgkin:

- HD13 für frühe Stadien
- HD14 für intermediäre Stadien

Rektumkarzinom:

- CAO/ARO/AIO-04: Präoperative Radio-/Chemotherapie und adjuvante Chemotherapie mit 5-Fluorouracil plus Oxaliplatin im Vergleich zu einer präoperativen Radio-/Chemotherapie und adjuvanten Chemotherapie mit 5-Fluorouracil beim lokal fortgeschrittenen Rektumkarzinom (Phase III-Studie)

Bronchialkarzinom:

- GILT-1: Simultane Radiochemotherapie mit Vinorelbin oral und Cisplatin plus Konsolidierungstherapie mit 2 weiteren Zyklen Vinorelbin oral/Cisplatin versus alleiniger Beobachtung beim inoperablen nichtkleinzelligen Bronchialkarzinom im Stadium III
- PEASON-NIS: Epidemiologische Studie zur Erfassung des EGFR-Mutationsstatus bei Patienten mit Erstdiagnose eines nicht-kleinzelligen Bronchialkarzinoms im Stadium IIIB/IV